


# KOMPAKT 5C

Til vekstregulering av pryddplanter i veksthus

50214224



## ADVARSEL

Kan være etsende for metaller

Farlig ved svelgning

Farlig ved hudkontakt

VED SVELGNING: Kontakt umiddelbart

GIFTINFORSMASJONEN/en lege.

Skyll munnen.

VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.

Kontakt GIFTINFORSMASJONEN/en lege

ved ubehag.

Unngå innånding av aerosoler.

Oppbevares innelåst.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk egnet verneutstyr (se

forsiktighetsregler).

Uskadeliggjør tomemballasjen (se

avfallshåndtering).

## Sammensetning:

Aktivstoff:  
Klormekvatklorid 460 g/l (41,4% w/w)

Hjelpestoff:  
Kolinklorid 320 g/l (28,8% w/w)

REG.NR. 2019.17

Avgiftsklasse 2

Nettoinnhold: 10 L

Distributør:  
Felleskjøpet Agri  
Depotgata 22  
N-2000 Lillestrøm  
Norge  
Tlf 03520

Innehaver av godkjenning:  
Klarsø A/S  
Søholm Park 1  
DK-2900 Hellerup  
Danmark

Produksjonsnummer: Se emballasjen  
Produksjonsdato: Se emballasjen

613f\_ik

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for mennesker og miljø. Det er forbudt å bruke Kompakt 5C i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

**Bruksområde**  
Til vekstregulering av pryddplanter i veksthus

**Virkemåte**  
KOMPAKT 5C brukes i pryddplanter i veksthus. Kompakt 5C er et vannløselig konsentrat (SL) KOMPAKT 5C tas opp gjennom både røtter og blad. Midlet kan derfor både sprøytes eller vannes ut. Middelet er veksthemmende, i tillegg fremmes ofte blomstring av KOMPAKT 5C. Produktet virker optimalt, når temperaturen ligger mellom 15-18° C. Høyere eller lavere temperaturer hemmer opptak og effekt. Virkningen av KOMPAKT 5C kommer 1-3 dager etter behandling, og den varer som regel i 5-10 dager. Opptøringen skal skje langsomt, og det bør ikke vannes, bruses eller sprøytes med andre midler før ett døgn etter bruk av preparatet.

KOMPAKT 5C tas best opp gjennom unge, fullt utviklede blad, og sprøyting gir derfor den sterkeste effekten. For å redusere risiko for bladskader, kan KOMPAKT 5C vannes ut. Ved utvanning økes konsentrasjonen ofte betydelig for å oppnå tilstrekkelig effekt. Når KOMPAKT 5C vannes ut, skjer opptak gjennom røttene. For å få godt opptak av KOMPAKT 5C skal det være optimalt klima i veksthuset, som sikrer god fordampning fra plantene.

**Bruksrettledning**  
KOMPAKT 5C anbefales til følgende pryddplanter:

Art/sort	Antall behandlinger per sesong
<i>Azalea, Rhododendron simsii,</i>	1
<i>Abutilon spp., Anisodonteia capensis, Argyranthemum frutescens, Campanula spp., Capsicum annuum, Dahlia, Dianthus spp., Euphorbia pulcherrima, Fuchsia hybrida, Geranium, Hibiscus rosa-sinensis, Hypoestes phyllostachya, Impatiens spp., Nerium oleander, Pelargonium spp., Petunia, Viola, Verbena</i>	1-2
<i>Osteospermum ecklonis</i>	3-4

**Dosering ved sprøyting:**  
0,05-0,26% styrke (50-260 ml KOMPAKT 5C/100 l vann)  
Bruk 100-200 ml væske per m<sup>2</sup> – avhengig av bladmasse.

**Dosering ved utvanning:**  
0,26% styrke (260 ml KOMPAKT 5C/100 l vann)  
Bruk 50-100 ml væske per plante – avhengig av pottestørrelse.

De angitte doseringene er veiledende. Det anbefales å bruke egne og veilederes anbefalinger når disse er avvikende fra angitte doser. Dog må ikke dosering overskride det som er tillatt på etikett.

Behandlingen kan gjøres med 1 til 3 ukers mellomrom og maksimum 3 ganger.

Ved utvanning med KOMPAKT 5C tilføres klor (klorid) og nitrogen, og det kan være nødvendig å korrigere gjødslingsregime i forhold til dette.

Da forskjellige sorter reagerer ulikt under varierende vekstforhold, anbefales alltid (hver gang), at KOMPAKT 5C først prøves på et mindre areal/antall. Det holdes kontroll med eventuelle skadevirkninger i 7-10 dager etter behandling. Unngå å behandle plantene i sterkt sollys. Unngå å behandle pelargonium spp. hvis temperaturen kan falle til under 10°C.

Midlet er skånsomt overfor populasjoner av *Typhlodromus pyri*, *Aphidius rhopalosiphii*, *Poecilus cupreus*, *Aleochara bilineata* og *Chrysoperla carnea*.

Bruk sammen med andre nyttyedyr er ukjent.

## Tillaging av sprøytevæske:

For tillaging av sprøytevæske skal sprøyte, filtre, og dyser være omhyggelig rengjorte samt kontrollert for avleiringer. Dette gjelder spesielt, hvis sprøyte/anlegg har vært brukt i andre kulturer. Påfylling må kun gjøres i det veksthuset, hvor midlet skal brukes, og her gjelder de samme regler for oppsamling av eventuelt søl og skyllevann som for vaskeplasser generelt. Påfylling gjøres så det ikke er mulighet for tilbakepomp til vannforsyningen. Tanken fylles ¾ opp med rent vann. Midlet tilsettes under omrøring, deretter fylles tanken helt. Det skal være konstant omrøring til utsprøyting. Fysikalsk-kjemisk blandbarhet mellom KOMPAKT 5C og andre produkter er ikke testet.

## Sprøyteknikk:

Arbeidet skal til enhver tid skje slik at overlapping på det behandlede areal samt at søl utenfor arealet begrenses til et minimum og at avdrift til omgivelsene unngås. Det skal alltid velges en passende bomhøyde over kulturen slik at det kan skje en jevn fordeling på kulturen. Ved utvanning holdes væsken under konstant omrøring. Utvanningen foregår via eksisterende anlegg eller særskilt utvanningstutstyr.

## Forsiktighetsregler

Bruk vernehansker av nitril/ neopren av god kvalitet, støvler og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av sprøyteåke, skal overtrekksdress og helmaske med kombinasjonsfilter A1/P3 brukes. Tilsøtte klær må umiddelbart fjernes og vaskes før bruk. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tf. 22 59 13 00 (åpent hele døgnet).

## Håndteringsfrist

Anbefalt verneutstyr (vernehansker, støvler og overtrekksdress) må benyttes dersom en går inn i behandlet område, eller håndterer behandlede plantedeler når det fremdeles er vått etter sprøyting. I veksthus må hansker benyttes ved arbeid med behandlede planter.

## Rengjøring av utstyr

Tomemballasje skylles minst tre ganger med vann, og innholdet tømmes i sprøyteanken. Rester i sprøyteanken fortnes om lag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettledning. Skyll sprøyteutstyret etter bruk på et sted som ikke gir avrenning til vann. Ved skifte av preparat for sprøyting i omfintlige kulturer må sprøyteutstyr rengjøres med All Clear® Extra eller annet anbefalt vaskemiddel.

## Avfallshåndtering

Grundig rengjort tomemballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Konsentrerte rester av plentevernemiddel og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

## Lagring

KOMPAKT 5C oppbevares i originalemballasjen og ved temperatur over 0 °C, samt beskyttet mot direkte sollys og andre varmekilder. Produktet er holdbart minst 2 år fra produksjonsdato.

## Merk

Det er mange faktorer som kan ha innflytelse på produktets virkning, spesielt støds- eller regionsbetingende faktorer. Herunder hører for eksempel vær og jordforhold, kulturplantensorter, vekselbruk, behandlingstidspunkt, anvendt mengde, blanding med andre produkter, forekomst av resistente organismer, sprøyteknikk og så videre. Ved spesielt ugunstige forhold kan man ikke utelukke at det kan skje forandringer i produktets virkning eller at det kan oppstå skader på kulturplanter. For slike forhold har ikke produsent eller forhandler noe ansvar.

613b\_ik