

Oppfôring av føll med melkeerstatning

Slik går du fram for å flaske opp et morløst føll med Salvana melkeerstatning:

Det aller beste er om føllet kan ammes opp av en annen melkende hoppe, men dersom dette ikke lar seg gjøre har vi noen råd om hvordan du bruker Salvana melkeerstatning til føll.

SALVANA melkeerstatning til føll inneholder kun råvarer av høy kvalitet

- Melkeprotein er naturlig og lettfordøyelig for føll
- Druesukker for raskt tilgjengelig energi
- Utvalgte lettfordøyelige fettkomponenter
- Gir fullstendig dekning av føllets behov for vitaminer og mineraler

Det er av meget viktig at føllet får råmelk i løpet av sine første 6 timer før man tar i bruk melkeerstatning. Når du er sikker på at føllet har fått råmelk kan du begynne med følgende drikkeplan:

Føllets alder	Antall måltider per dag	Blanding per måltid Forventet voksenvekt 500 kg		Blanding per måltid Forventet voksenvekt 350 kg	
		Liter vann	Gram pulver	Liter vann	Gram pulver
1. døgn	10	0,45	50	0,30	30
2. døgn	10	0,55	75	0,35	50
3. døgn	10	0,70	100	0,45	65
4. døgn	10	0,80	120	0,50	75
5. døgn	10	0,95	140	0,60	90
6. døgn	10	1,1	160	0,70	100
7. døgn	10	1,2	180	0,75	115
2. uke	8	1,7	250	1,1	160
3. uke	8	1,9	275	1,3	175
4.-5. uke	7	2,2	325	1,4	210
6.-8. uke	6	2,6	380	1,7	240
9.-12. uke	5	3,0	450	1,9	290
13.-14. uke	4	3,2	480	2,0	310
15.-16. uke	3	3,0	450	1,9	290
17.-20. uke	2	3,0	450	1,9	290

Konsentrasjon i denne drikkeplanen bør følges, men man kan eventuelt blande noe svakere dersom føllet får diaré. For føll med forventet voksenvekt som avviker fra disse eksemplene kan du regne deg fram til riktig mengde ut fra blandingsforholdet i tabellene over og føllets forventede voksenvekt. Det er greit å ha noe lenger intervaller mellom måltidene om natten enn om dagen. De første døgnene er det en fordel om man klarer å ha hyppigere fôring enn minimumet som er foreslått!

PRAKTISKE TIPS

Det kan for mange være mest praktisk å blande en hel dagsrasjon hver morgen, og la det ubrukte stå i kjøleskap. Før fôring varmes riktig mengde opp til ca. 38-42 grader før det gis til føllet. Mange små føll liker melken best dersom den er god og varm. Fra føllet er ca. en måned gammelt kan melkeerstatningen gis uten oppvarming dersom føllet godtar det. Til å begynne med vil de fleste føll drikke best av flaske, men det anbefales å gå over til bøttefôring så raskt som mulig. Du lærer føllet å drikke fra bøtte ved å la det suge på fingeren din, og så føre hånden ned i bøtta med melk mens føllet fremdeles suger på den. Da vil føllet oftest lett forstå at det er veldig enkelt å drikke av bøtte i forhold til fra flaske. Enkelte føll har et stort sugebehov, og vil aller helst drikke av flaske.

Fra føllet er to uker gammelt kan det tilbys høy og rent vann. Fra føllet er en måned gammelt kan det også tilbys kraftfôr. Velg et godt og næringsrikt høy og Champion Føll, som er et spesialkraftfôr til føll. Til å begynne med får det høy og kraftfôr mest for å venne seg til smaken, men når føllet blir eldre er det viktig med fast føde for at føllets fordøyelsessystem skal utvikle seg riktig. Etter ca. 5 måneder kan føllet slutte med melkeerstatning dersom det har blitt flinkt til å spise annen fôr.

RENHOLD

Det er svært viktig at alt utstyr som blir brukt til oppbevaring og utblanding av melken holdes grundig rent. Dårlig renhold fører lett til at det blomstrer opp uheldige bakterier som vil gi føllet diaré. I din Felleskjøpetbutikk kan du få råd om midler for renhold, og du kan også få kjøpt flasker, smokker og annet utstyr for blanding og oppbevaring av melken.

KONTAKT DYRLEGE

Dersom det morløse føllet mister appetitten bør du være spesielt oppmerksom på om det kan ha utviklet magesår. Føll som har fått lite eller dårlig råmelk vil være ekstra utsatt for infeksjoner de første månedene av livet. Vær raskt ute med å kontakte veterinær dersom føllet får feber, spiser dårlig eller viser tegn til magesmerter. Leddbetennelser, lungebetennelse, navleinfeksjon og diaré er vanlige komplikasjoner hos føll som ikke har nok antistoffer fra råmelk i blodet.

